



NAMA ILMIAH

Shorea platyclados

NAMA LOKAL INDONESIA

Meranti bukit, Banio (Sumatra), Ketir (South Kalimantan), Meranti cingham (Eastern Sumatra)

FAMILI POHON

DIPTEROCARPACEAEKETINGGIAN TEMPAT
TUMBUH (M)**700-1350M**

RERATA UKURAN DAUN (CM)

7.5CM × 2.5CM

Panjang Lebar

TINGGI POHON

TINGGI (> 35M)

DISTRIBUSI

ASLI DI INDONESIA

ASLI DI

Kawasan: Asia

Malaysia, Singapura, Thailand

Indonesia: Kalimantan, Sumatra

INFORMASI AGROFORESTRY KOPI

SISTEM KEBUN KOPI

ROBUSTA **ARABIKA**

REGENERASI

Belum Diketahui

KELAZIMAN

Belum Diketahui

MANFAAT PADA KOPI

Belum Diketahui

PENGOLAHAN

DITANAM

PERAWATAN POHON

Diperbanyak dengan benih. Tabur biji secepat mungkin dan dianjurkan untuk merendam biji selama 12 jam sebelum disemai. Saat bibit telah mencapai tinggi 5-6 m (2 minggu setelah berkecambah), tanam pada wadah berukuran 15 x 23 cm dengan lubang drainase yang baik. Gunakan campuran tanah hutan dan pasir (perbandingan 3:1) sebagai media tanam untuk memasukkan mikoriza yang tepat pada akar. Letakkan bibit di bawah naungan dengan 50 - 60% sinar matahari dan siram dua kali sehari. Bibit dapat ditanam apabila telah mencapai tinggi 30-40 cm dan harus diletakkan di bawah sinar matahari penuh selama satu bulan sebelum ditanam.

MANFAAT DAN PENGGUNAAN POHON

PENGGUNAAN

**Kayu Bakar, Kayu Pertukangan**

JASA LINGKUNGAN

Belum Diketahui

MANFAAT BAGI KEANEKARAGAMAN HAYATI

Belum Diketahui

Kayunya digunakan untuk membuat jembatan, dermaga, tiang, dan untuk konstruksi yang membutuhkan kayu yang sangat kuat.

Terakhir Diperbarui: February 4, 2021

Foto: <http://specimens.kew.org/herbarium/K000700664> The Herbarium Catalogue, Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet <http://www.kew.org/herbcat> [accessed on 10 12 2020].