



ESPECIE DE ÁRBOL (NOMBRE CIENTÍFICO)

Aspidosperma macrocarpon

PERU NOMBRE COMÚN

Pumaquiro

FAMILIA DE ÁRBOL

APOCYNACEAE

TAMAÑO PROMEDIO DE LA HOJA (CM)

Desconocido

RANGO DE ELEVACIÓN (M)

Desconocido

ALTURA DEL ÁRBOL

MEDIANO (20–35 M)



DISTRIBUCIÓN



NATIVA DE PERU

NATIVA DE

Región: Americas

América Latina: Bolivia, Brazil, Paraguay, Peru, Venezuela

SISTEMA AGROFORESTAL CAFETALERO

TIPO DE CAFÉ



ARÁBICA

IMPACTO DEL CAFÉ

Desconocido

EL CULTIVO



PLANTADO

MANEJO DEL ÁRBOL

Las semillas deben plantarse tan pronto como estén maduras en sombra parcial en recipientes individuales. Se puede esperar una baja tasa de germinación, con la semilla brotando dentro de 10 a 25 días. Las plántulas crecen lentamente y deben estar listas para plantar 8 meses después de la siembra inicial. La semilla tiene una viabilidad de menos de 4 meses. La madera recién cortada y la savia causan irritación de los ojos, la nariz y la garganta.

PREVALENCIA

Desconocido

BENEFICIOS Y USOS DEL ÁRBOL

USOS DE PRODUCTORES



Madera, Ornamental

Se cosecha de la naturaleza para el uso local para la construcción, la construcción naval, los mangos de herramientas y la carpintería. Tiene follaje atractivo, se puede utilizar para el paisajismo.

SERVICIOS AGRÍCOLAS

Desconocido

BENEFICIOS PARA BIODIVERSIDAD

No

Última actualización: August 14, 2023

Foto: Aspidosperma macrocarpon leaves photo; Aspidosperma macrocarpon trunk photo: Denise Sasaki © RBG Kew <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> Aspidosperma macrocarpon flowers photo; Aspidosperma macrocarpon wood photo: William Milliken © RBG Kew <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>

Jezeer, Rosalien. (2018). PhD dissertation: Shedding Light on Shade- Reconciling Livelihoods and Biodiversity in Coffee Agroforests. 10.13140/RG.2.2.28895.71844.;

Tropical Plants Database, Ken Fern. tropical.theferns.info/viewtropical.php?id=Aspidosperma+macrocarpon