

ESPECIE DE ÁRBOL (NOMBRE CIENTÍFICO)

# *Pouteria bilocularis*

PERU NOMBRE COMÚN

Caimitillo

FAMILIA DE ÁRBOL

**SAPOTACEAE**

TAMAÑO PROMEDIO DE LA HOJA (CM)

**11.86cm** × **6.04cm**  
Largo Ancho

DISTRIBUCIÓN



**NATIVA DE PERU**

RANGO DE ELEVACIÓN (M)

**350-1500m**

ALTURA DEL ÁRBOL

**MEDIANO (20-35 M)**



NATIVA DE

**Región:** Americas

**América Latina:** Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Venezuela

## SISTEMA AGROFORESTAL CAFETALERO

TIPO DE CAFÉ



**ARÁBICA**

IMPACTO DEL CAFÉ

Desconocido

MANEJO DEL ÁRBOL

En Brasil se obtuvieron una tasa de germinación de 86% un mes después de extraer las semillas de la fruta. Se debe lavar las frutas por 30 minutos, secarlas a la sombra durante 18 horas a temperatura ambiente y plantarlas a una pulgada de profundidad en un sustrato de arena y aserrín.

EL CULTIVO



**PLANTADO**

PREVALENCIA

No común en cafetales

## BENEFICIOS Y USOS DEL ÁRBOL

USOS DE PRODUCTORES

Desconocido

SERVICIOS AGRÍCOLAS

Desconocido

BENEFICIOS PARA BIODIVERSIDAD



**SÍ**

Los frutos son comidos por el mono *Cebus apella*.

Última actualización: August 15, 2023

Cruz, E. D. (2005). Quantitative characteristics of fruits and seeds of *Pouteria pachycarpa* Pires-Sapotaceae. *Revista Brasileira de Sementes*, 27, 159-164.;

Pennington, T.D. & R. Bernal 2022-7-12. *Pouteria bilocularis* (H.J.P.Winkl.) Baehni En Bernal, R., S.R. Gradstein & M. Celis (eds.). 2015. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. <http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co>;

WFO (2022): *Pouteria bilocularis* (H.J.P.Winkl.) Baehni. Accessed on: 12 Jul 2022. Published on the Internet <http://www.worldfloraonline.org/taxon/wfo-0000281573>;

Mendoza, A. L. M., & Guerrero, M. H. (2010). Catálogo de los árboles y afines de la Selva Central del Perú. *Amaldoa*, 17, 203-242.